

Листок-вкладыш – информация для пациента
Валсартан Канон, 40 мг,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Валсартан Канон, 80 мг,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Валсартан Канон, 160 мг,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Валсартан Канон, 320 мг,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Действующее вещество: валсартан.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Валсартан Канон, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Валсартан Канон.
3. Прием препарата Валсартан Канон.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Валсартан Канон.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Валсартан Канон, и для чего его применяют

Препарат Валсартан Канон содержит действующее вещество валсартан, которое относится к фармакотерапевтической группе под названием «средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; антагонисты рецепторов ангиотензина II», и применяется для контроля над высоким артериальным давлением.

Показания к применению

Препарат Валсартан Канон применяется у взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Взрослые

- при артериальной гипертензии;
- при хронической сердечной недостаточности (ХСН) (II-IV функциональный класс по классификации NYHA) у взрослых пациентов, получающих стандартную терапию одним или несколькими препаратами из следующих фармакотерапевтических групп: диуретиками, сердечными гликозидами, а также ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или бета-адреноблокаторами. Применение каждого из перечисленных препаратов не является обязательным. Оценка состояния пациентов с ХСН должна включать оценку функции почек;
- для повышения выживаемости пациентов после перенесенного острого инфаркта миокарда, осложненного левожелудочковой недостаточностью и/или систолической дисфункцией левого желудочка, при наличии стабильных показателей гемодинамики.

Дети и подростки

- при артериальной гипертензии.

Способ действия препарата Валсартан Канон

У каждого человека в организме кровь создает давление на стенки сосудов. Давление в артериях называется «артериальное давление». Оно обеспечивает ток крови по всему телу и может меняться в зависимости от времени суток, уровня активности или эмоционального состояния. Однако при артериальной гипертензии (гипертонии) давление остается стабильно высоким, даже когда человек спокоен и расслаблен. Важную роль в регуляции давления играет гормон ангиотензин II, который вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Частое и длительное повышение давления опасно, так как увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к нарушению работы важных органов: сердца, почек, головного мозга. Валсартан, действующее вещество препарата Валсартан Канон, блокирует действие ангиотензина II на рецепторы. Это вызывает расслабление стенок сосудов и артериальное давление снижается. В результате Вы чувствуете облегчение, при этом риски, связанные с осложнениями гипертонии, снижаются. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Валсартан Канон

Противопоказания

Не принимайте препарат Валсартан Канон:

- если у Вас аллергия на валсартан или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если у Вас серьезно нарушена работа печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью), хроническое заболевание, при котором поражаются желчные протоки (билиарный цирроз) и нарушен отток и выведение желчи из организма (холестаз);
- если у Вас высокий уровень сахара крови (сахарный диабет) и/или умеренное или тяжелое нарушение функции почек, и при этом Вы принимаете алискирен (препарат, снижающий артериальное давление);
- если у Вас сахарный диабет и вызванное им заболевание почек (диабетическая нефропатия), и при этом Вы принимаете препараты, снижающие артериальное давление (ингибиторы АПФ).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Валсартан Канон проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите Вашему врачу, если что-то из нижеперечисленного имеет отношение к Вам (или Вашему ребенку):

- если у Вас есть хроническое заболевание, при котором поражаются желчные протоки (билиарный цирроз) и нарушен отток и выведение желчи из организма (холестаз);
- если у Вас есть серьезное заболевание почек, в том числе, если Вы находитесь на гемодиализе;
- если у Вас есть двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки;
- если Вы перенесли пересадку (трансплантацию) почки;
- если у Вас есть сахарный диабет и нарушена работа почек;
- если у Вас диагностирован первичный гиперальдостеронизм – состояние, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона;
- если у Вас есть хроническая сердечная недостаточность, или Вы недавно перенесли инфаркт миокарда. В точности следуйте рекомендациям Вашего лечащего врача относительно начальной дозы препарата Валсартан Канон. Ваш лечащий врач также может назначить Вам обследование, чтобы оценить работоспособность почек;
- если у Вас есть хроническая сердечная недостаточность тяжелой степени, пороки сердца (такие как митральный или аортальный стеноз) или генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся утолщением стенок сердца (гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия);
- если Вы потеряли много жидкости (обезвоживание) по причине диареи, рвоты или Вы принимаете высокие дозы диуретиков (мочегонных препаратов) или соблюдаете диету с ограничением соли;

- если у Вас когда-либо возникал отек лица, губ, языка, глотки и/или гортани (ангионевротический отек включая отек Квинке) на фоне приема других лекарственных препаратов, в том числе антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ, либо у Вас диагностирован наследственный ангионевротический отек. В случае возникновения ангионевротического отека на фоне лечения препаратом Валсартан Канон **прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Возобновление приема препарата Валсартан Канон запрещено.**

Сообщите врачу, если после приема препарата Валсартан Канон у Вас появились боли в животе, тошнота, рвота или диарея. Врач примет решение о дальнейшем лечении. Не прекращайте прием препарата Валсартан Канон самостоятельно.

Дети и подростки

Артериальная гипертензия

Не давайте препарат Валсартан Канон детям в возрасте от 0 до 6 лет по показанию артериальная гипертензия, так как безопасность и эффективность валсартана у данной группы не установлены.

Хроническая сердечная недостаточность и перенесенный острый инфаркт миокарда

Не давайте препарат Валсартан Канон детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет для лечения хронической сердечной недостаточности и после перенесенного острого инфаркта миокарда. Данные применения отсутствуют.

Другие препараты и препарат Валсартан Канон

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

- препараты, применяемые для снижения артериального давления, особенно диуретики (мочегонные препараты), ингибиторы АПФ или алискирен. Ваш лечащий врач может проводить регулярный контроль функции почек и содержание калия в крови;
- препараты, которые могут повышать уровень калия: калийсберегающие диуретики (например, спиронолактон, триамтерен, амилорид), препараты калия, гепарин, заменители соли, содержащие калий;
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), применяемые для облегчения боли или воспаления, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ингибиторы ЦОГ-2);
- препараты лития (применяются для лечения некоторых психических расстройств);
- некоторые антибиотики (группа рифампицина), препараты, применяемые для защиты от отторжения трансплантата (циклоспорин) или антиретровирусные препараты, применяемые для лечения ВИЧ/СПИД-инфекции (ритонавир).

Если Вы не уверены, принимаете ли Вы какой-либо из препаратов, перечисленных выше, спросите об этом у Вашего лечащего врача.

Если во время лечения препаратом Валсартан Канон Вам был выписан новый лекарственный препарат, сообщите врачу, что Вы принимаете препарат Валсартан Канон.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Валсартан Канон, если Вы беременны. Если Вы забеременели (или предполагаете, что забеременели) во время приема препарата Валсартан Канон, немедленно обратитесь к врачу. Врач может подобрать Вам другое лечение.

Предположительно, прием валсартана в первые 3 месяца беременности может повышать риск возникновения пороков развития плода; его прием после 3-го месяца беременности может причинить серьезный вред плоду вплоть до его внутриутробной (до рождения) гибели.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Валсартан Канон, если Вы кормите ребенка грудью.

Обсудите с лечащим врачом, если Вы хотите продолжать грудное вскармливание (особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным), врач сможет подобрать Вам другое лечение.

Фертильность

Нет данных о влиянии приема препарата на фертильность человека. При исследовании на животных не наблюдалось эффектов воздействия валсартана на фертильность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Валсартан Канон может вызывать головокружение и кратковременную потерю сознания (обморок). Соблюдайте осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

3. Прием препарата Валсартан Канон

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Пациенты с повышенным артериальным давлением часто не замечают никаких признаков этой проблемы. Многие могут чувствовать себя вполне нормально. Поэтому важно принимать препарат точно так, как Вам назначил лечащий врач, и регулярно посещать врача, даже если Вы чувствуете себя хорошо.

Рекомендуемая доза:

Ваш лечащий врач скажет Вам, какое именно количество таблеток препарата Валсартан Канон и в какой дозировке следует принимать. В зависимости от Вашего ответа на терапию препаратом Валсартан Канон, врач может рекомендовать более высокую или более низкую дозу.

Артериальная гипертензия

Рекомендуемая доза валсартана для взрослых с повышенным артериальным давлением обычно составляет 80 мг или 160 мг 1 раз в сутки. В случае недостаточной эффективности лечения врач может назначить более высокую дозу (до 320 мг в сутки) или рекомендовать дополнительный лекарственный препарат (например, диуретик).

Хроническая сердечная недостаточность

Взрослым пациентам с хронической сердечной недостаточностью лечение валсартаном обычно начинают с дозы 40 мг 2 раза в сутки. Дозу постепенно увеличивают до 80 мг 2 раза в сутки и затем до 160 мг 2 раза в сутки в зависимости от переносимости лечения пациентом. Максимальная суточная доза составляет 320 мг в 2 приема.

Пациенты после перенесенного острого инфаркта миокарда
Взрослым пациентам лечение валсартаном обычно начинают в течение 12 часов после перенесенного инфаркта миокарда. Начальная доза составляет 20 мг 2 раза в сутки. Ваш лечащий врач будет постепенно увеличивать эту дозу в течение нескольких недель до достижения целевой дозы 160 мг 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 320 мг 2 раза в 2 приема.

Применение у детей и подростков

Артериальная гипертензия

Максимальная суточная доза препарата Валсартан Канон у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет составляет 80 мг при массе тела менее 35 кг, 160 мг - при массе тела от 35 кг до 80 кг и 320 мг - при массе тела 80 кг и более.

Путь и (или) способ введения

Препарат Валсартан Канон предназначен только для приема внутрь.

Таблетку следует проглатывать, не разжевывая, запивая водой. Препарат Валсартан Канон можно принимать независимо от приема пищи.

Продолжительность терапии

Продолжительность применения препарата определяется врачом индивидуально, не прекращайте прием препарата без консультации с лечащим врачом. Если у Вас создается впечатление, что эффект препарата очень сильный или недостаточный, проинформируйте об этом Вашего лечащего врача.

Если Вы приняли препарата Валсартан Канон больше, чем следовало

Следует незамедлительно связаться с врачом или ближайшим медицинским учреждением. Возьмите с собой упаковку принятого препарата. У Вас могут появиться нежелательные реакции, описанные в разделе 4 листка-вкладыша.

При передозировке валсартаном основным симптомом является выраженное снижение артериального давления, которое может привести к угнетению сознания (дефицит психической активности со снижением уровня бодрствования, отчетливым угнетением интеллектуальных функций и двигательной активности), коллапсу (внезапная сердечно-сосудистая недостаточность, с потерей сознания и угрозой смерти) и/или шоку. При случайной передозировке вызовите рвоту (если препарат был принят недавно). Примите положение лежа.

Если Вы забыли принять препарат Валсартан Канон

Если Вы забыли принять препарат Валсартан Канон примите его сразу же как только обнаружили это, а следующую дозу примите в обычное время. Если время приема следующей дозы почти наступило, просто примите следующую таблетку в обычное время.

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы восполнить пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Валсартан Канон

Не прекращайте самостоятельно прием препарата, даже если Вы почувствуете себя лучше. В противном случае Ваши симптомы вернутся, а состояние может ухудшиться.

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Валсартан Канон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сразу прекратите прием препарата Валсартан Канон и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций, которые возникают:

- часто** – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:
 - слабость, головокружение, внезапная потеря сознания, снижение систолического артериального давления ниже 90 миллиметров ртутного столба, что может признаками артериальной гипотензии.
- нечасто** – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:
 - резкое снижение количества выделяемой мочи (диуреза), повышение артериального давления и появление отеков, что может быть признаками тяжелого нарушения работы почек, что может признаками острой почечной недостаточности.
- очень редко** – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:
 - ангионевротический отек кишечника: отек кишечника, проявляющийся такими симптомами, как боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- бронхоспазм, одышка, приступ астмы, отек верхних дыхательных путей, вплоть до полной невозможности сделать вдох, снижение слуха из-за отека слизистой внутри евстахиевой трубы, высыпания на коже, такие как крапивница и экзема, что может быть признаками реакции повышенной чувствительности включая сывороточную болезнь;
- отечность в области рта, лица, губ, языка или горла, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, что может быть признаками ангионевротического отека.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Валсартан Канон:

- часто** – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:
 - головокружение;
 - сильное недолговременное головокружение, и вызывается некоторыми положениями головы (постуральное головокружение);
 - резкое снижение артериального давления вплоть до обморока при вставании (ортостатическая гипотензия).
- нечасто** – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:
 - нарушение пространственной ориентации (вертиго);
 - кашель;
 - боль в животе;
 - повышение концентрации калия в крови (гиперкалиемия);
 - кратковременная потеря сознания (обморок);
 - головная боль;
 - усиление симптомов хронической сердечной недостаточности (одышка, затруднение дыхания в положении лежа, отечность стоп или ног);
- тошнота;
- диарея;
- повышение концентрации креатинина в сыворотке крови;
- ощущение постоянной усталости и слабости (астения);
- повышенная утомляемость.

частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- снижение гемоглобина в крови;
- снижение гематокрита в крови;
- снижение количества нейтрофилов в крови (нейтропения);
- снижение уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- повышение содержания калия в сыворотке крови;
- воспаление сосудов (васкулит);
- нарушение функции печени, включая повышение концентрации билирубина в плазме крови;
- образование пузырей и/или пузырьков на коже (буллезный дерматит);
- кожная сыпь;
- кожный зуд;
- боль в мышцах (миалгия);
- нарушения функции почек;
- повышение концентрации креатинина в сыворотке крови;
- снижение уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- повышение активности «печеночных» ферментов;
- повышение содержания азота мочевины в плазме крови.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Валсартан Канон

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Валсартан Канон содержит

Действующим веществом является валсартан.

Валсартан Канон, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 40 миллиграмм валсартана.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный, кросповидон, магния стеарат, повидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101); *готовая пленочная оболочка оранжевая:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тальк, титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172). Валсартан Канон, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 80 миллиграмм валсартана.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный, кросповидон, магния стеарат, повидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101); *готовая пленочная оболочка оранжевая:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тальк, титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172). Валсартан Канон, 160 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 160 миллиграмм валсартана.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный, кросповидон, магния стеарат, повидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101); *готовая пленочная оболочка оранжевая:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тальк, титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172). Валсартан Канон, 320 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 320 миллиграмм валсартана.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кремния диоксид коллоидный, кросповидон, магния стеарат, повидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101); *готовая пленочная оболочка оранжевая:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тальк, титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172). **Внешний вид препарата Валсартан Канон и содержимое упаковки**

Валсартан Канон, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – ядро почти белого цвета.

Валсартан Канон, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – ядро почти белого цвета.

Валсартан Канон, 160 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – ядро почти белого цвета.

Валсартан Канон, 320 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки овальные двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – ядро почти белого цвета.

По 7 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или пленки ПВХ/ПВДХ, или пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 98 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена высокой плотности с крышкой из полипропилена с силикагелем, обеспечивающей защиту от детей, или в банку из полиэтилена высокой плотности с крышкой натягиваемой или навинчиваемой из полиэтилена низкой плотности с контролем первого вскрытия, или в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена низкого давления с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия (состав полимера: 25 % ПЭНД + 75 % ПЭВД) с вложением силикагеля, или в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилентерефталата с крышкой из полипропилена с вложением силикагеля.

По 2, 4 контурных ячейковых упаковки по 7 таблеток или по 3, 6, 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105. Телефон: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: safety@canonpharma.ru

Производитель

Российская Федерация
ЗАО «Канонфарма продакшн»

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 11.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105. Телефон: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: safety@canonpharma.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru> (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPc).