

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 5 мг, таблетки
Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 10 мг, таблетки
Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 5 мг, таблетки
Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 10 мг, таблетки

Перед приёмом данного препарата полностью прочитайте этот листок, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения. Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

- Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Амлодипин+Периндоприл Канон, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Амлодипин+Периндоприл Канон.
3. Прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Амлодипин+Периндоприл Канон.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Амлодипин+Периндоприл Канон, и для чего его принимают

Действующими веществами препарата Амлодипин+Периндоприл Канон являются амлодипин, который относится к лекарственной группе под названием: «Блокаторы кальциевых каналов», и периндоприл, относящийся к лекарственной группе под названием: «Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ингибитор АПФ)». Их совместное действие приводит к расширению и расслаблению кровеносных сосудов, таким образом, кровь легче проходит по сосудам. Это помогает сердцу поддерживать хороший кровоток, улучшает кровоснабжение сердца и снижает повышенное артериальное давление.

Показания к применению

Препарат Амлодипин+Периндоприл Канон применяется у взрослых от 18 лет для лечения:

- Артериальная гипертензия и/или ишемическая болезнь сердца (ИБС): стабильная стенокардия напряжения у пациентов, которым требуется терапия амлодипином и периндоприлом.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Амлодипин+Периндоприл Канон

Противопоказания

Не принимайте препарат Амлодипин+Периндоприл Канон:

- если у Вас имеется аллергия на периндоприл или любой другой ингибитор АПФ, на амлодипин или другой антагонист кальция, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6),
- если Вы беременны со сроком более 3-месяцев (см. подраздел «Беременность, грудное вскармливание, фертильность»),
- если раньше при приеме других ингибиторов АПФ у Вас появлялись такие симптомы, как: свистящее дыхание, отек лица или языка (состояние, называемое ангионевротический отек), интенсивный зуд или обильная кожная сыпь, или данные симптомы отмечались у одного из Ваших родственников,
- если Вы принимаете препарат для снижения артериального давления, содержащий алискирен, и при этом у Вас есть сахарный диабет или нарушение функции почек,
- если у Вас нарушена функция почек,
- если у Вас есть сужение аортального клапана сердца (стеноз аорты) или кардиогенный шок (состояние, при котором ваше сердце не в состоянии обеспечить достаточный кровоток в организме),
- если у Вас отмечается выраженное понижение артериального давления (гипотензия), если Вы страдаете от сердечной недостаточности после сердечного приступа,
- если Вам проводится диализ или любой другой тип фильтрации крови. В зависимости от используемого оборудования, Амлодипин+Периндоприл Канон может оказаться не подходящим для Вас препаратом,
- если у Вас тяжелое заболевание почек, которое может включать стеноз почечной артерии (снижение притока крови к почкам),
- если Вы принимаете комбинацию валсартан + сакубитрил - препарат, применяемый для лечения сердечной недостаточности (см. подразделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Другие препараты и препарат Амлодипин+Периндоприл Канон»).

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Амлодипин+Периндоприл Канон проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно предупредите Вашего лечащего врача, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- если у Вас гипертрофическая кардиомиопатия (болезнь сердечной мышцы),
- если у Вас стеноз почечной артерии (сужение артерии, снабжающей кровью почки), если у Вас сердечная недостаточность или другое заболевание сердца,
- если у Вас выраженное повышение артериального давления (гипертонический криз), если у Вас нарушение функции печени,
- если у Вас заболевание почек или Вам проводится диализ,
- если у Вас аномально повышенный уровень гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм),
- если у Вас системное заболевание соединительной ткани (группа заболеваний, характеризующаяся поражением соединительной ткани), такое как системная красная волчанка или склеродермия,
- если у Вас сахарный диабет,
- если Вы соблюдаете диету с пониженным содержанием соли или принимаете заменители соли, содержащие калий,
- если Вы - человек пожилого возраста и у Вас планируется увеличение дозы препарата, если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, используемых для лечения высокого артериального давления:
 - блокаторы рецепторов ангиотензин II (БРА) (также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас есть связанные с сахарным диабетом заболевания почек,
 - алискирен.

Ваш врач может проводить регулярный мониторинг функции почек, артериального давления и содержания электролитов (например, калия) в крови.

Смотрите также информацию, приведенную в разделе «Противопоказания».

- Если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, риск развития ангионевротического отека может повыситься:
 - рацекадотрил (применяется для лечения диареи),
 - сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к так называемым ингибиторам mTOR (применяются для предотвращения отторжения пересаженных органов),
 - сакубитрил (выпускается в фиксированной комбинации с валсартаном), применяющийся для лечения хронической сердечной недостаточности.
- Если Вы принадлежите к негроидной расе, так как Вы можете быть подвержены более высокому риску развития ангионевротического отека, а также этот препарат может быть менее эффективен в снижении артериального давления в сравнении с пациентами другой расовой принадлежности.

Ангионевротические отек (отек Квинке)

У пациентов, принимавших препараты ингибитора АПФ, в том числе периндоприл, отмечались случаи отека Квинке (серьезной аллергической реакции с сопутствующим отеком лица, губ, языка или горла, затрудненным глотанием или дыханием). Такая реакция может возникнуть в любое время в период лечения. При возникновении этих симптомов следует прекратить прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон и немедленно обратиться к врачу (смотрите также раздел «Возможные нежелательные реакции»).

Вы должны проинформировать своего лечащего врача или медицинского персонал о том, что принимаете препарат Амлодипин+Периндоприл Канон в следующих случаях:

- Если Вам предстоит общий наркоз и/или серьезная хирургическая операция,
 - Если у Вас недавно наблюдались понос (диарея) или рвота,
 - Если Вам необходимо проводить диализ или аферез липопротеинов низкой плотности (аппаратное выведение холестерина из крови),
- Если Вы собираетесь пройти курс десенсибилизации, чтобы понизить чувствительность к аллергическому эффекту укусов пчел и ос.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет в связи с тем, что данные об эффективности и безопасности препарата Амлодипин+Периндоприл Канон у данной группы пациентов отсутствуют.

Другие лекарственные препараты и препарат Амлодипин+Периндоприл Канон

Сообщите Вашему лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие препараты.

Избегайте одновременного приема препарата Амлодипин+Периндоприл Канон со следующими препаратами:

- *Литий* (используется для лечения мании или депрессии);
- *Эстрамустин* (используется для лечения рака);
- Калийсберегающие диуретики (*спиронолактон, триамтерен, амилорид*), калиевые добавки или калийсодержащие заменители соли;
- Калийсберегающие диуретики, применяемые для лечения сердечной недостаточности: *эплеренон* и *спиронолактон* в дозах 12,5 – 50 мг/сут.

На лечение препаратом Амлодипин+Периндоприл Канон может повлиять прием других препаратов. Врач может изменить дозу и/или принять меры предосторожности.

Обязательно поставьте в известность лечащего врача, если Вы принимаете следующие препараты, так как при их приеме следует соблюдать особую осторожность:

- Другие препараты для лечения повышенного артериального давления, включая блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), *алискирен* (см. также информацию, приведенную в разделе «Противопоказания») и «Особые предупреждения и меры предосторожности», диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками), блокаторы кальциевых каналов (*верапамил, дилтиазем*), бета-адреноблокаторы (лекарства, модулирующие активность симпатической нервной системы, которая регулирует некоторые бессознательные действия организма),
- Препараты, которые чаще всего используются для лечения диареи, (*рацекадотрил*) или для профилактики отторжения трансплантируемых органов (*сиролимус, эверолимус, темсиролимус* и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых, ингибиторов mTor). См. раздел «Предостережение и меры предосторожности»,
- Комбинация *валсартан+сакубитрил* (применяемая для лечения хронической сердечной недостаточности). См. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»,
- Нестероидные противовоспалительные препараты (например, *ибупрофен*) для снятия боли или высокие дозы аспирина,
- Препараты для лечения диабета (например, *инсулин*, производные сульфонилмочевины, препараты, относящиеся к классу так называемых глиптинов (*линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин*)),
- Препараты для лечения психических расстройств, таких как депрессия, тревога, или шизофрения и др. (например, трициклические антидепрессанты, антипсихотические препараты, антидепрессанты группы имипрамина, нейролептики),
- Иммунодепрессантные препараты (препараты, понижающие защитные механизмы организма), которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций (например, *такролимус, такролимус*),
- Средства для общей анестезии (используются для отключения сознания и защитных рефлексов организма во время медицинских процедур, которые в противном случае были бы невыносимо болезненными, или для предотвращения бодрствования пациента),
- *Триетоприм* и *Ко-тримоксазол* (для лечения инфекций),
- *Аллопуринол* (для лечения подагры),
- *Прокаинамид* (для лечения нерегулярного сердечного ритма),
- Сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (вещества расширяющие кровеносные сосуды),
- *Гепарин* (препараты для разжижения крови),
- *Эфедрин, норадреналин* или *адреналин* (препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы),
- *Баклофен* или *дантролен* (инфузия), которые используются для лечения жесткости мышц, наступающей при таких заболеваниях, как например, рассеянный склероз, дантролен также применяется для лечения злокачественной гипертермии при анестезии (ее симптомы: очень высокая температура тела или жесткость мышц),
- Некоторые антибиотики, такие как *рифампицин, эритромицин, кларитромицин* (против инфекций, вызванных бактериями),
- *Симвастатин* (препарат для снижения холестерина),
- Противосудорожные средства, такие как *карбамазепин, фенобарбитал, феноитоин, фосфеноитоин, примидон*,
- *Интраконазол, кетоконазол* (препараты, применяемые для лечения грибковых инфекций),
- Альфа-блокаторы, применяемые при лечении увеличения простаты, такие как *празозин, алфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин*,
- *Амифостин* (используется для предупреждения или снижения побочных эффектов, вызванных другими препаратами или лучевой терапией, применяемых при лечении рака),
- *Гиперикум перфоратум* (Зверобой продырявленный, растительный лекарственный препарат, используемый для лечения депрессии),
- Кортикостероиды, (которые используются для лечения разных заболеваний, включая тяжелую астму и ревматоидный артрит),
- Золотосодержащие соли, особенно при введении внутривенно (используются для лечения симптомов ревматоидного артрита),
- *Ритонавир, индинавир, нелфанавир* (так называемые ингибиторы протеазы, используемые для лечения ВИЧ),
- Рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (rtPA, алтеплаза): препарат, используемый для растворения сгустков крови при опасных для жизни сердечнососудистых заболеваниях, таких как ишемический инсульт.

Препарат Амлодипин+Периндоприл Канон с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Амлодипин+Периндоприл Канон следует принимать перед едой.

Не следует принимать грейпфрутовый сок и грейпфрут во время лечения препаратом Амлодипин+Периндоприл Канон, так как грейпфрут и грейпфрутовый сок могут привести к увеличению уровня действующего вещества амлодипина в крови, и как следствие к резкому уменьшению артериального давления.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Врач порекомендует Вам прекратить прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон до наступления беременности или сразу после того, как факт беременности подтвердится. Он также предложит перейти на другой препарат, так как прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон на ранней стадии беременности не рекомендуется, а его прием после 3-го месяца беременности может нанести серьезный вред ребенку.

Грудное вскармливание

Если Вы кормите, или планируете кормить грудью, проинформируйте об этом своего врача. Не рекомендуется назначать Амлодипин+Периндоприл Канон кормящим матерям. Врач может назначить Вам другое лечение, если Вы хотите кормить грудью, особенно если ребенок новорожденный или недоношенный.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Амлодипин+Периндоприл Канон может влиять на Вашу способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Если во время приема данного лекарственного препарата Вы чувствуете тошноту, головокружение, слабость, утомляемость или головную боль, воздержитесь от управления транспортными средствами или механизмами и немедленно обратитесь к своему лечащему врачу.

3. Прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Одна таблетка в сутки. Ваш лечащий врач может изменить режим приема препарата.

Способ применения

Внутрь, в одно и тоже время суток, предпочтительно утром, перед приемом пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая водой.

Продолжительность применения

Препараты для лечения артериальной гипертензии должны приниматься постоянно.

Если Вы приняли препарата Амлодипин+Периндоприл Канон больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Наиболее вероятным симптомом в случае передозировки является снижение артериального давления. Если у Вас резко снизилось артериальное давление (состояние, сопровождающееся головокружением и слабостью), примите горизонтальное положение и приподнимите ноги. Это может улучшить Ваше состояние.

Если Вы забыли принять препарат Амлодипин+Периндоприл Канон

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять очередную дозу препарата Амлодипин+Периндоприл Канон, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата Амлодипин+Периндоприл Канон, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон

Поскольку лечение повышенного артериального давления обычно проводится постоянно, не прекращайте прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон без предварительного обсуждения с Вашим лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата Амлодипин+Периндоприл Канон обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Амлодипин+Периндоприл Канон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Амлодипин+Периндоприл Канон и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения любой из вышеуказанных серьезных нежелательных реакций:

Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100

- внезапное свистящее дыхание, боль в груди, одышка, или затрудненное дыхание (бронхоспазм)
- отек век, лица или губ, отек языка и горла, что вызывает выраженное затруднение дыхания (ангионевротический отек)
- нарушение ритма сердца (аритмия, тахикардия)
- сильное головокружение, обморочное состояние

Очень редко - могут возникнуть не более чем у 1 человека из 10000

- тяжелые кожные реакции, включая интенсивную кожную сыпь, крапивницу, покраснение кожи на всем теле, сильный зуд, образование пузырей, шелушение и отек кожи (эксфолиативный дерматит) и отслоение верхних слоев кожи, воспаление слизистых оболочек (синдром Стивенса-Джонсона) или другие аллергические реакции
- отек век, лица или губ, отек языка и горла, что вызывает выраженное затруднение дыхания (отек Квинке)
- сердечный приступ (инфаркт миокарда)
- боль в груди (стенокардия)
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое может вызвать серьезные боли в животе и спине, сопровождающиеся плохим самочувствием

Неизвестно - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно

- тяжелые кожные реакции, включая интенсивную кожную сыпь, крапивницу, покраснение кожи на всем теле, сильный зуд, образование пузырей, шелушение и отек кожи, отслоение верхних слоев кожи, воспаление слизистых оболочек (токсический эпидермальный некролиз, который имеет сходные проявления с указанным выше синдромом Стивенса-Джонсона, но более тяжелое течение)

Другие нежелательные реакции, о которых сообщалось при применении препаратов амлодипина и периндоприла:

Очень часто - могут возникать у более чем 1 человека из 10

- задержка жидкости (отеки)

Часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10

- сонливость (особенно в начале лечения)
- головная боль (особенно в начале лечения)
- расстройство вкуса (дисгевзия)
- онемение или покалывание в конечностях (парестезия)
- нарушение зрения
- двойное зрение (диплопия)
- звон в ушах
- головокружение (вертиго)
- ощущение сердцебиения
- «приливы» крови к коже лица
- пониженное артериальное давление и его симптомы (гипотензия и эффекты, связанные с гипотензией)
- одышка
- кашель
- боль в животе
- тошнота
- рвота
- затруднение пищеварения (диспепсия)
- изменение частоты и характера стула
- диарея
- запор
- кожный зуд
- сыпь, в том числе кожная сыпь (экзантема)
- припухлость в области лодыжек (припухлость в области суставов)
- мышечные спазмы
- повышенная утомляемость
- слабость (астения)

Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100

- заложенность носа или насморк (ринит)
- повышенное содержание эозинофилов (вид лейкоцитов) (эозинофилия)
- аллергические реакции (гиперчувствительность)
- очень низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) у пациентов с сахарным диабетом
- высокий уровень калия в крови, снижающийся после прекращения терапии
- гиперкалиемия, обратимая после отмены препарата
- низкий уровень натрия в крови (гипонатриемия)
- бессонница
- перепады настроения (лабильность настроения (включая тревожность))
- депрессия
- нарушение сна
- дрожание, непроизвольные ритмичные движения частей тела или всего тела (тремор)
- снижение чувствительности, например, чувствительности кожи (гипестезия)
- воспаление кровеносных сосудов (васкулит)
- сухость во рту
- выпадение волос (алопеция)
- мелкие кровоизлияния кожи или слизистых оболочек (пурпура)
- изменение цвета кожи
- повышенная потливость
- появление зудящих волдырей на коже (крапивница)
- повышенная чувствительность кожи к солнцу (реакции фоточувствительности)
- отслоение кожи и образование пузырей (пемфигοид)
- боль в суставах (артралгия)
- мышечная боль (миалгия)
- боль в спине
- нарушение мочеиспускания, повышенная потребность в мочеиспускании в ночное время (никтурия), увеличение количества мочи (поллакиурия)
- почечная недостаточность
- импотенция (эректильная дисфункция)
- дискомфорт или увеличение грудных желез у мужчин (гинекомастия)
- отеки кожи и подкожной клетчатки, например, отеки ног (периферические отеки)
- боль в грудной клетке
- боль
- недомогание
- лихорадка
- увеличение массы тела, снижение массы тела
- повышение концентрации мочевины в крови
- повышение концентрации креатинина в крови
- падение

Редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000

- спутанность сознания
- обострение псориаза
- повышение активности печеночных ферментов
- повышение концентрации билирубина в крови

Очень редко - могут возникнуть не более чем у 1 человека из 10000

- снижение количества лейкоцитов в крови (лейкопения)
- снижение количества нейтрофилов (вид лейкоцитов) (нейтропения)
- очень низкое количество нейтрофилов (вид лейкоцитов) (агранулоцитоз)
- снижение количества лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в крови (панцитопения)
- снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения)
- снижение уровня гемоглобина и гематокрита
- снижение количества эритроцитов в крови (гемолитическая анемия) у пациентов с врожденной недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
- повышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия)
- патологическое напряжение мышц (гипертонус)
- нарушение работы чувствительных и/или двигательных нервов (периферическая нейропатия)

- нарушение движений или речи, что может быть признаком возможного инсульта (возможно вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска)
- редкий тип пневмонии - эозинофильная пневмония
- припухлость десен (гиперплазия десен)
- воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит)
- воспаление печени, пожелтение кожи и/или слизистых оболочек (гепатит, желтуха)
- особые виды воспаления печени - цитолитический или холестатический гепатит
- повышение активности печеночных ферментов (наиболее часто в сочетании с холестазом)
- кожная сыпь, которая часто начинается с красных зудящих пятен на лице, руках или ногах (многоформная эритема)
- острая почечная недостаточность

Неизвестно - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно

- дрожь, напряженная поза, маскообразное лицо, медленные движения и шаркающая, неуравновешенная походка (экстрапиримидные расстройства (экстрапиримидный синдром))
- изменение цвета кожи, онемение и боль в пальцах рук или ног (синдром Рейна)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через национальную систему сообщений в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата Амлодипин+Периндоприл Канон:

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Телефоны: +7 (495) 698-45-38

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Адрес в интернете: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у специалиста в области здравоохранения, как следует утилизировать препарат, который больше не требуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Амлодипин+Периндоприл Канон содержит

Действующими веществами являются периндоприла аргинин и амлодипин.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 5 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит амлодипина безилата 6,935 мг, соответствует амлодипину 5,0 мг и периндоприла аргинина 5,0 мг, соответствует периндоприлу 3,395 мг.

Прочими ингредиентами являются: карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал кукурузный прегелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, кремния диоксид коллоидный гидрофобный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 10 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит амлодипина безилата 6,935 мг, соответствует амлодипину 5,0 мг и периндоприла аргинина 10,0 мг, соответствует периндоприлу 6,79 мг.

Прочими ингредиентами являются: карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал кукурузный прегелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, кремния диоксид коллоидный гидрофобный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 5 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит амлодипина безилата 13,87 мг, соответствует амлодипину 10,0 мг и периндоприла аргинина 5,0 мг, соответствует периндоприлу 3,395 мг.

Прочими ингредиентами являются: карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал кукурузный прегелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, кремния диоксид коллоидный гидрофобный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 10 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит амлодипина безилата 13,87 мг, соответствует амлодипину 10,0 мг и периндоприла аргинина 10,0 мг, соответствует периндоприлу 6,79 мг.

Прочими ингредиентами являются: карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал кукурузный прегелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, кремния диоксид коллоидный гидрофобный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат.

Внешний вид препарата Амлодипин+Периндоприл Канон и содержимое упаковки

Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 5 мг, таблетки

Таблетки круглые двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60, 90 или 120 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полиэтилена или полипропилена.

По 1, 2, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 5 мг + 10 мг, таблетки

Таблетки круглые двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60, 90 или 120 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полиэтилена или полипропилена.

По 1, 2, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 5 мг, таблетки

Таблетки круглые двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60, 90 или 120 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полиэтилена или полипропилена.

По 1, 2, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Амлодипин+Периндоприл Канон, 10 мг + 10 мг, таблетки

Таблетки круглые двояковыпуклые с риской, белого или почти белого цвета.

По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60, 90 или 120 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полиэтилена или полипропилена.

По 1, 2, 3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная,

д. 105. Тел.: +7 (495) 797-99-54,

Электронный адрес: safety@canonpharma.ru

Получить дополнительные данные о препарате, сообщить о нежелательных лекарственных реакциях можно по телефону 8 (800) 700-59-99 (бесплатная линия 24 часа) или на сайте www.canonpharma.ru в разделе «Политика в области качества» - «Безопасность препаратов».

Листок-вкладыш пересмотрен 16.01.2025

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eccc.eaeunion.org>.